



Buletini i Austria Praemix

Kategoria: Shpendë

Përmbajtja:

1.KONCEPTE TË TË USHQYERIT TË PULAVE3

1.KONCEPTE TË TË USHQYERIT TË PULAVE

Përpunuar nga Kristian Maka



Pulat për vezë

Gjatë fazës së rritjes dhe me vonë, gjatë asaj të pjelljes së vezëve, kërkesat e pulave për lëndë ushqyese ndryshojnë vazhdimisht. Kjo, si pasojë e nevojës së përdorimit të llojeve të ndryshme të ushqimit, në varësi të stadi të zhvillimit dhe performancës së shpendit - të ushqyerit me faza.

Të ushqyerit është baza thelbësore për rritjen normale të shpendëve nga zogj në zoga e deri te pulat e rritura për vezë. Koncepti i të ushqyerit duhet të bazohet në kërkesat e shpendit. Kërkesa për lëndë ushqyese varet gjithashtu nga ndryshimet në menaxhimin e fermave të pulave, nga faktorët mjedisorë, si dhe veçanërisht në format alternative të mbarështimit.

Konceptimi i llojeve individuale të ushqimit gjatë të ushqyerit me faza dhe përzgjedhja e lëndëve të para si drithërat, bartësit e proteinave, yndyrat dhe vajrat bimore, mineralet dhe aditivët duhet të përcaktohen rreptësisht në bazë të kërkesave të kafshëve për lëndë ushqyese.

Zogjtë/Zogat

Baza për fazën e shtrimit dhe më vonë të performancës së pulave vendoset që në fillim. Kur zogat kalojnë në kafaze (bateri), ato duhet karakterizohen veçanërisht nga një peshë optimale e trupi. Kjo duhet të jetë të paktën sa pesha e synuar e racës përkatëse, akoma më mire nëse, gjatë kalimit të zogave nëpër bateri, pesha është 50g deri në 100 g më e lartë.

Ushqimi për fazën e para-prodhimit/para-shtrimit

Pak para se të fillojë pjellja e vezëve, veçanërisht në sistemet alternative (në bateri), pulat duhet të përshtaten në kohën e duhur me mjedisin e ri. Prandaj është e dobishme zhvendosja e zogave në shtëpitë e pjelljes në një moshë të hershme, 16 deri në 17 javë.

Në këtë moshë, pulat ende nuk janë rritur plotësisht fiziologjikisht dhe për këtë arsye nuk duhet t'u jepet ushqim i fazës së pjelljes, pasi për shkak të përmbajtjes së lartë të kalciumit kjo "i shtyn" pulat shumë herët për të filluar pjelljen e vezëve. Në moshën 16 deri në 18 javë ose 17 deri në 19 javë, pulat në bateri marrin ende ushqimin e zogave dhe jo të pulës së vezës.

Në përgjithësi, duhet të shmangen zogat që janë shumë të lehta. Në asnjë moment gjatë periudhës së pjelljes këto zoga nuk tregojnë performancë normale, në përputhje me përbërjen e tyre gjenetike. Zogat nuk duhet të jenë me një peshë të lartë trupore. Përdorimi i ushqimit të zogave nga java e 9-të deri në 16-të e jetës është absolutisht i nevojshëm për të arritur një kapacitet të mirë të marrjes së ushqimit. Zogat duhet të ushqehen në bazë të kërkesave për secilën fazë të jetës dhe mënyrës së mbarështimit.

Sistemet e mbarështimit- Dysheme dhe Bateri

Për pulat e reja që rriten në sistem dysheme ose sistem bateri rekomandohet veçanërisht përdorimi i një ushqimi për fazën e para-prodhimit. Ushqimi fillestar ka rreth dyfishin e përmbajtjes së kalciumit, si dhe përmbajtje më të lartë të proteinave dhe aminoacideve, krahasuar me ushqimin e zogave. Prandaj, është shumë e rëndësishme që ky ushqim të përdoret për rreth 14 ditë para fillimit të planifikuar të pjelljes së vezëve - nëse kaloni herët në fazën e pjelljes, është e detyrueshme.

Ky ushqim përmirëson uniformitetin e tufës duke i lejuar shpendëve të rinj të maturohen, të marrin kalcium të mjaftueshëm për formimin e lëvozhgave të vezëve të para dhe duke siguruar ushqim më të mirë për shpendët me maturim të vonë. Periudha kohore e përdorimit të ushqimit për fazën e para-prodhimit/ para-shtrimit dhe koha optimale për kalimin në bateri duhet të koordinohen me mbarështuesin e pulave.

Zhvendosja e pulave përfaqëson një barrë të veçantë për shpendët. Kalimi në fazën e fillimit të pjelljes përfaqëson gjithashtu një ndryshim themelor në proceset fiziologjike. Organizmi duhet të përshtatet nga faza e rritjes dhe e formimit të trupit në fazën e fillimit të aktivitetit të pjelljes së vezëve, në të njëjtën kohë pulat nuk janë rritur ende plotësisht.

Gjithashtu, në këtë fazë ndryshimet hormonale ndikojnë në marrjen e ushqimit. Si rezultat, marrja e ushqimit në këtë fazë shpesh është më pak se 100 g për kafshë/ në ditë. Duke konsideruar kërkesat e pulës për lëndë ushqyese si dhe përmbajtjen e energjisë së ushqimit të përdorur, kjo sasi është absolutisht shumë pak. Në këtë fazë, duhet bërë çdo përpjekje për të rritur shpejt marrjen e ushqimit deri në 115 g në ditë, të ushqyerit disa herë në ditë, të ushqyerit në lugun bosh, duke ofruar ushqim me strukturë optimale dhe sisteme të të ushqyerit të mirë ndriçuar.

Dendësia e lëndëve ushqyese

Për të mbështetur marrjen e lëndëve ushqyese, është parë e arsyeshme, që pulave t'u ofrohet ushqim me një densitet më të lartë të lëndëve ushqyese (11,6 - 11,8 MJ/kg), kryesisht me një përmbajtje të rritur të aminoacideve. Nëse pula është e pafurnizuar me lëndë ushqyese gjatë fillimit të pjelljes, kjo rrezikon suksesin e të gjithë periudhës së pjelljes dhe çon në humbje të pakthyeshme në performancë. Por kujdes: Shtimi i ushqimit me një përmbajtje kalciumi prej më shumë se 3% nuk duhet të ofrohet shumë herët. Në koordinim me fermerin, rekomandohet përdorimi i ushqimit për fazën e para-prodhimit. Në fillim të periudhës së pjelljes, pulat duhet të arrijnë shpejt në nivele të mjaftueshme ushqimi. Mungesa e lëndëve ushqyese në fillim të pjelljes e rëndon metabolizmin e kafshëve dhe mund të kontribuojë në shfaqjen e sindromës së mëlçisë së dhjamosur. Vetëm kur pjelljet në tufë kanë arritur në rreth 5%, fillon kalimi në një ushqim starter me cilësi të lartë.

Për më shumë informacion:



**Qendra e Formimit
Profesional të Blegtorëve**

Austria Praemix shpk

Tel: +355 (0)68 402 6311

e-mail: agri@ap.com.al